


INSETTICIDA LARGO SPETTRO

INSETTICIDA POLIVALENTE

PFnPE



COD. ART.	CONFEZIONE	PZ/CRT	VENDITA	IVA
404010	 250 ml	24 pz	N P	10

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)

CARATTERISTICHE

L'INSETTICIDA LARGO SPETTRO è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, Sparganothispilleriana effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione. Olivo (piante non in produzione): contro mosca, tignola verde (*Palpita unionalis*) e tignola (generazione antofaga e carpofaga): 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Patata: contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

Carciofo: contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Altre orticole (in pieno campo): contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodopteralittoralis*, *Phthorimæa operculella*, *Pieris* sp., *Plutellasp.*, *Mamestra* sp., *Autographasp.*, *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoascasp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, isso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), *Diabroticasp.*, *Sitona* (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca* spp), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **TRATTARE DOPO LA RACCOLTA DEI TURIONI.** **COLZA, SENAPE, LINO:** contro altica, *Ceuthorinchus*, *Meligete*, effetto collaterale su *Dasineurabrassicæ* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Barbabietola da zucchero e da foraggio:** contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cleono, isso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (farro maggiore):** contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua gialla* (*Heliothis armigera*) e *Nottua delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Non trattare dopo la fine della fioritura.** **ERBA MEDICA:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedragossypiella*, *Eariasinulana*, *Agrotis segetum*, *Spodopteralittoralis*), *Crisomelide nero* (*Colaspidae mastrum*), *Punteruolo* (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio:** contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, *limantria* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Tabacco:** contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA (CARENZA)

28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; per MAIS non trattare dopo la fine della fioritura; per ASPARAGO trattare dopo la raccolta dei turioni; per tutte le altre colture eduli: 3 giorni.

CLASSIFICAZIONE (FRASI H)

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

CYTHRIN 50 EC

Registrazione del Ministero della Salute n. 13391 del 18/10/2011

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA

SI



ATTENZIONE



NEWPHARM Home&Garden S.r.l. - Via Dell'artigianato, 22 - 35010 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
T. +39 049 9303165 - Fax +39 049 9270501 - info@newpharmgarden.it - www.newpharmgarden.it